Vivaces

LISTE DES VÉGÉTAUX SUGGÉRÉS POUR LA REVÉGÉTALISATION

RAPPEL
Experts-conseils en environnement
et en gestion de l'eau



Table des matières

Classement des végétaux selon des critères d'acidité du sol 4
Classement des végétaux selon leurs besoin en humidité 5
Classement des végétaux selon leur dimension maximale 6
Classement des végétaux selon la composition du sol 7

Anemone canadensis – Anémone du Canada – Canada Anemone 8
Angelica atropurpurea – Angélique noire-pourprée – Purple angelica 8
Apocynum cannabinum – Apocyn chanvrin – Indian Hemp 9
Aquilegia canadensis – Ancolie du Canada – Gants de Notre-Dame 9
Asclepias incarnata – Asclépiade incarnate – Swamp Milkweed 10
Caltha palustris – Populage des marais – Marsh Marigold 10
Campanula rotundifolia – Campanule à feuilles rondes – Bluebell 11
Chelone glabra – Galane glabre – Snakehead 11
Comarum palustre – Potentille des marais – Marsh Cinquefoil 12
Epilobium angustifolium – Épilobe à feuilles étroites – Fireweed 13
Eurybia macrophylla – Aster à grandes feuilles – Large-leaved aster 13
Eupatorium perfoliatum – Eupatoire perfoliée – Perfoliate thoroughwort 14
Geum rivale – Benoîte des ruisseaux – Water Avens 15
Helenium autumnale – Hélénie automnale – Swamp Sunflower 15
Hypericum ascyron – Millepertuis pyramidal – American great St. John's-wort 16
Impatiens capensis – Impatiente du cap – Cape Touch-me-not 16
Iris versicolor – Iris versicolore – Larger Blue-Flag 17
Lobelia cardinalis – Lobélie du Cardinal – Cardinal-flower 18
Lysimachia terrestris – Lysimaque terrestre – Yellow loosestrife 18
Maianthemum stellatum – Smilacine étoilée – Star-flowered lily-of-the-valley 19
Mentha canadensis – Menthe du Canada – Canada mint 19
Mimulus ringens – Mimule à feuilles entrouvertes – Monkey-flower 20
Monarda fistulosa – Monarde fistuleuse – Wild Bergamot 20
Myosotis laxa – Myosotis laxiflore – Small Forget-me-not 21
Physostegia virginiana – Physostégie de Virginie – False Dragon-head 21
Rudbeckia laciniata – Rudbeckie laciniée – Cut-leaved Coneflower 22
Scutellaria galericulata var. *pubescens* – Scutellaire à feuilles d'épilobe – Marsh skullcap 22

Scutellaria lateriflora – Scutellaire à fleurs latérales – Side-flowering Skullcap 23
Solidago rugosa – Verge d'or rugueuse – Rough-stemmed goldenrod.....23
Verbena hastata – Verveine hastée – Blue Vervain.....24
Zizia aurea – Zizia dorée – Golden Meadow-Parsnip 24

Classement des végétaux selon des critères d'acidité du sol

Alcalin

Vivaces

Apocynum cannabinum (Apocyn chanvrin)
Aquilegia canadensis (Ancolie du Canada)
Desmodium canadense (Desmodie du Canada)
Eupatorium perfoliatum (Eupatoire perfoliée)
Myosotis laxa (Myosotis laxiflore)
Rudbeckia laciniata (Rudbeckie laciniée)
Scutellaria lateriflora (Scutellaire à fleurs latérales)
Verbena hastata (Verveine hastée)
Zizia aurea (Zizia dorée)

Indéterminée

Vivaces

Anemone canadensis (Anémone du Canada)
Caltha palustris (Populage des marais)
Eurybia macrophylla (Aster à grandes feuilles)
Geum rivale (Benoîte des ruisseaux)
Lobelia cardinalis (Lobélie du Cardinal)
Lysimachia terrestris (Lysimaque terrestre)
Physostegia virginiana (Physostégie de Virginie)
Scutellaria galericulata var. *pubescens* (Scutellaire à feuilles d'épilobe)
Solidago rugosa (Verge d'or rugueuse)

Neutre

Vivaces

Asclepias incarnata (Asclépiade incarnate)
Eupatorium perfoliatum (Eupatoire perfoliée)
Iris versicolor (Iris versicolore)
Lilium canadense (Lis du Canada)
Rudbeckia laciniata (Rudbeckie laciniée)

Moyenne

Vivaces

Asclepias incarnata (Asclépiade incarnate)
Comarum palustre (Potentille des marais)
Eupatorium maculatum (Eupatoire maculée)
Hypericum ascyron (Millepertuis pyramidal)
Impatiens capensis (Impatiente du cap)
Iris versicolor (Iris versicolore)
Mentha canadensis (Menthe du Canada)
Mimulus ringens (Mimule à feuilles entrouvertes)

Indifférente (faible à élevée)

Vivaces

Apocynum cannabinum (Apocyn chanvrin)

Élevée

Vivaces

Asclepias incarnata (Asclépiade incarnate)
Comarum palustre (Potentille des marais)
Eupatorium maculatum (Eupatoire maculée)
Eupatorium perfoliatum (Eupatoire perfoliée)
Geum rivale (Benoîte des ruisseaux)
Hypericum ascyron (Millepertuis pyramidal)
Impatiens capensis (Impatiente du cap)
Iris versicolor (Iris versicolore)
Lobelia cardinalis (Lobélie du Cardinal)
Mimulus ringens (Mimule à feuilles entrouvertes)
Maianthemum stellatum (Smilacine étoilée)
Physostegia virginiana (Physostégie de Virginie)
Zizia aurea (Zizia dorée)

Faible

Vivaces

Chelone glabra (Galane glabre)
Iris versicolor (Iris versicolore)
Lilium canadense (Lis du Canada)

Classement des végétaux selon leurs besoin en humidité

Faible
Vivaces
Aquilegia canadensis (Ancolie du Canada)
Campanula rotundifolia (Campanule à feuilles rondes)
Epilobium angustifolium (Épilobe à feuilles étroites)
Monarda fistulosa (Monarde fistuleuse)
Solidago rugosa (Verge d'or rugueuse)

Moyenne
Vivaces
Anemone canadensis (Anémone du Canada)
Angelica atropurpurea (Angélique noire-pourprée)
Apocynum cannabinum (Chanvre du Canada)
Asclepias incarnata (Asclépiade incarnate)
Desmodium canadense (Desmodie du Canada)
Eupatorium maculatum (Eupatoire maculée)
Eurybia macrophylla (Aster à grandes feuilles)
Helenium autumnale (Hélénie automnale)
Hypericum ascyron (Millepertuis pyramidal)
Impatiens capensis (Impatiente du cap)
Iris versicolor (Iris versicolore)
Lilium canadense (Lis du Canada)
Lobelia cardinalis (Lobélie du Cardinal)
Maianthemum stellatum (Smilacine étoilée)
Mentha canadensis (Menthe du Canada)
Mimulus ringens (Mimule à feuilles entrouvertes)
Myosotis laxa (Myosotis laxiflore)
Physostegia virginiana (Physostégie de Virginie)
Rudbeckia laciniata (Rudbeckie laciniée)
Scutellaria lateriflora (Scutellaire à fleurs latérales)
Solidago rugosa (Verge d'or rugueuse)
Verbena hastata (Verveine hastée)
Zizia aurea (Zizia dorée)

Élevée
Vivaces
Anemone canadensis (Anémone du Canada)
Apocynum cannabinum (Apocyn chanvrin)
Asclepias incarnata (Asclépiade incarnate)
Caltha palustris (Populage des marais)
Chelone glabra (Galane glabre)
Comarum palustre (Potentille des marais)
Eupatorium maculatum (Eupatoire maculée)
Eupatorium perfoliatum (Eupatoire perfoliée)
Geum rivale (Benoîte des ruisseaux)
Helenium autumnale (Hélénie automnale)
Hypericum ascyron (Millepertuis pyramidal)
Impatiens capensis (Impatiente du cap)
Iris versicolor (Iris versicolore)
Lobelia cardinalis (Lobélie du Cardinal)
Lysimachia terrestris (Lysimaque terrestre)
Mentha canadensis (Menthe du Canada)
Mimulus ringens (Mimule à feuilles entrouvertes)
Physostegia virginiana (Physostégie de Virginie)
Rudbeckia laciniata (Rudbeckie laciniée)
Scutellaria galericulata var. pubescens (Scutellaire à feuilles d'épilobe)
Zizia aurea (Zizia dorée)

Classement des végétaux selon leur dimension maximale

Hauteur de moins de 1 mètre
Vivaces
Anemone canadensis (Anémone du Canada)
Aquilegia canadensis (Ancolie du Canada)
Caltha palustris (Populage des marais)
Campanula rotundifolia (Campanule à feuilles rondes)
Chelone glabra (Galane glabre)
Comarum palustre (Potentille des marais)
Geum rivale (Benoîte des ruisseaux)
Helenium autumnale (Hélénie automnale)
Impatiens capensis (Impatiente du cap)
Iris versicolor (Iris versicolore)
Lobelia cardinalis (Lobélie du Cardinal)
Lysimachia terrestris (Lysimaque terrestre)
Maianthemum stellatum (Smilacine étoilée)
Mentha canadensis (Menthe du Canada)
Mimulus ringens (Mimule à feuilles entrouvertes)
Monarda fistulosa (Monarde fistuleuse)
Myosotis laxa (Myosotis laxiflore)
Physostegia virginiana (Physostégie de Virginie)
Scutellaria galericulata var. pubescens (Scutellaire à feuilles d'épilobe)
Scutellaria lateriflora (Scutellaire à fleurs latérales)
Zizia aurea (Zizia dorée)

Hauteur entre 1 et 2 mètres
Vivaces
Angelica atropurpurea (Angélique noire-pourprée)
Apocynum cannabinum (Apocyn chanvrin)
Asclepias incarnata (Asclépiade incarnate)
Desmodium canadense (Desmodie du Canada)
Epilobium angustifolium (Épilobe à feuilles étroites)
Eupatorium maculatum (Eupatoire maculée)
Eupatorium perfoliatum (Eupatoire perfoliée)
Eurybia macrophylla (Aster à grandes feuilles)
Hypericum ascyron (Millepertuis pyramidal)
Lilium canadense (Lis du Canada)
Rudbeckia laciniata (Rudbeckie laciniée)
Solidago rugosa (Verge d'or rugueuse)
Verbena hastata (Verveine hastée)

Classement des végétaux selon la composition du sol

Sol graveleux

Vivaces

Campanula rotundifolia (Campanule à feuilles rondes)
Scutellaria lateriflora (Scutellaire à fleurs latérales)

Sol argileux

Vivaces

Desmodium canadense (Desmodie du Canada)
Helenium autumnale (Hélénie automnale)
Lobelia cardinalis (Lobélie du Cardinal)

Sol sablonneux

Vivaces

Aquilegia canadensis (Ancolie du Canada)
Maianthemum stellatum (Smilacine étoilée)
Mentha canadensis (Menthe du Canada)
Scutellaria lateriflora (Scutellaire à fleurs latérales)

Sol loameux

Vivaces

Anemone canadensis (Anémone du Canada)

Tous

Vivaces

Apocynum cannabinum (Apocyn chanvrin)
Asclepias incarnata (Asclépiade incarnate)
Epilobium angustifolium (Épilobe à feuilles étroites)
Eurybia macrophylla (Aster à grandes feuilles)
Impatiens capensis (Impatiente du cap)
Iris versicolor (Iris versicolore)
Lilium canadense (Lis du Canada)
Lysimachia terrestris (Lysimaque terrestre)
Mimulus ringens (Mimule à feuilles entrouvertes)
Mentha canadensis (Menthe du Canada)
Myosotis laxa (Myosotis laxiflore)
Physostegia virginiana (Physostégie de Virginie)
Scutellaria galericulata var. pubescens (Scutellaire à feuilles d'épilobe)
Scutellaria lateriflora (Scutellaire à fleurs latérales)
Solidago rugosa (Verge d'or rugueuse)
Verbena hastata (Verveine hastée)
Zizia aurea (Zizia dorée)

Vivaces


Anemone canadensis – Anémone du Canada - Canada Anemone



Thomas G. Barnes @ USDA-NRCS PLANTS Database

Position recommandée par rapport au talus		
Haut du talus	Milieu du talus	Bas du talus (zone littorale)
X	X	

Ensoleillement requis :
Dimensions : 30 à 60 cm ↕ 30 cm ↔
Type de sol : Loameux à loam argileux
Acidité du sol : Indéterminée
Humidité du sol : Moyenne à élevée
Zone de rusticité : 3
Période de floraison : Printanière
Croissance : Rapide




Robert H. Mohlenbrock @ USDA-NRCS PLANTS Database

Commentaires : Généralisée dans les marais et les tourbière. Préfère les sols fertiles. Peut faire des colonies. Tolère les sols constamment humide.

Attrait particulier : Très belle plante avec de grandes fleurs blanches, donnant des fruits en tête globuleuse.

Angelica atropurpurea – Angélique noire-pourprée - Purple angelica



Robert H. Mohlenbrock @ USDA-NRCS PLANTS Database

Position recommandée par rapport au talus		
Haut du talus	Milieu du talus	Bas du talus (zone littorale)
X	X	

Ensoleillement requis :
Dimensions : 100 à 250 cm ↕ 100 cm ↔
Type de sol : Riche
Acidité du sol : Ne tolère pas les sols acides
Humidité du sol : Moyenne
Zone de rusticité : 3
Période de floraison : Estivale




© Carol Levine http://ct-botanical-society.org/galleries/

Commentaires : En massif, les fleurs donnent un effet saisissant.


Attrait particulier : Plante gigantesque aux tiges pourpres. Fleurs vertes donnant des fruits noirs. Très aromatique.

Apocynum cannabinum – Apocyn chanvrin – Indian Hemp



Ensoleillement requis :
Dimensions : 70 à 120 cm ↕ 50 cm ↔
Type de sol : Tous
Acidité du sol : Alcalin
Humidité du sol : Moyenne à élevée
Zone de rusticité : 3
Période de floraison : Estivale

Position recommandée par rapport au talus		
Haut du talus	Milieu du talus	Bas du talus (zone littorale)
X	X	X



Attrait particulier : Possède des tiges rougeâtres. Petites fleurs blanches qui donnent des fruits verts allongés réunis par 2. Fleurs parfumées attirant les papillons. Plante toxique.

Commentaires : Espèce formant des buissons.

Aquilegia canadensis – Ancolie du Canada – Gants de Notre-Dame



Ensoleillement requis :
Dimensions : 30 à 60 cm ↕ 25 à 45 cm ↔
Type de sol : Sablonneux
Acidité du sol : Calcaire
Humidité du sol : Faible
Zone de rusticité : 3
Période de floraison : Juin-juillet

Position recommandée par rapport au talus		
Haut du talus	Milieu du talus	Bas du talus (zone littorale)
X	X	



Commentaires : L'une de nos plus belles fleurs indigènes. Aussi appelé « Gants de Notre-Dame ». Espèce attirant les colibris. Pousse bien dans les rocailles.


Attrait particulier : Les fleurs pendantes sont écarlates et munies d'éperons dans lesquels on retrouve une goutte de nectar qui fait le régale des oiseaux-mouches.

Asclepias incarnata – Asclépiade incarnate – Swamp Milkweed



Ensoleillement requis :
Dimensions : 60 à 120 cm ↕ 40 à 60 cm ↔
Type de sol : Tous
Acidité du sol : Acide à neutre
Humidité du sol : Moyenne à élevée
Zone de rusticité : 3
Période de floraison : Juin à août

Position recommandée par rapport au talus		
Haut du talus	Milieu du talus	Bas du talus (zone littorale)
X	X	



Commentaires : Espèce ne supportant pas toujours bien la transplantation. Attire les papillons, particulièrement les monarques.

Attrait particulier : Petites fleurs rose foncé regroupées en ombelles dégageant un agréable parfum.

Caltha palustris – Populage des marais – Marsh Marigold



Ensoleillement requis :
Dimensions : 15 à 75 cm ↕ 25 cm ↔
Type de sol : Riche, marécageux
Acidité du sol : Indéterminée
Humidité du sol : Élevée
Zone de rusticité : 3
Période de floraison : Avril-mai


Position recommandée par rapport au talus		
Haut du talus	Milieu du talus	Bas du talus (zone littorale)
X	X	



Commentaires : Espèce indigène des milieux humides. Établit des colonies de centaines d'individus dans des fossés très humides.

Attrait particulier : Feuilles rondes cordées au bout d'un long pétiole. Fleurs d'un jaune brillant.

Campanula rotundifolia – Campanule à feuilles rondes – Bluebell


Mary Clay Stensvold @ USDA-NRCS PLANTS Database

Ensoleillement requis :
Dimensions : 10 à 30 cm ↕ 15 cm ↔
Type de sol : Graveleux
Acidité du sol : Ne tolère pas les sols acides
Humidité du sol : Faible
Zone de rusticité : 3
Période de floraison : Estivale


Gary A. Monroe@ USDA-NRCS PLANTS Database

Position recommandée par rapport au talus		
Haut du talus	Milieu du talus	Bas du talus (zone littorale)
X	X	


Commentaires : Forme des touffes fines et raides. Préfère les sols rocailleux.

Attrait particulier : Belles fleurs bleus en forme de clochettes. Attire les colibris.

Chelone glabra – Galane glabre – Snakehead


© Missouri Botanical Garden, 2001-2008

Ensoleillement requis :
Dimensions : 30 à 100 cm ↕ 45 cm ↔
Type de sol : Riche
Acidité du sol : Légèrement acide
Humidité du sol : Élevée
Zone de rusticité : 3
Période de floraison : Juillet à octobre


Robert H. Mohlenbrock @ USDA-NRCS PLANTS Database

Position recommandée par rapport au talus		
Haut du talus	Milieu du talus	Bas du talus (zone littorale)
X	X	

Commentaires : Floraison généreuse. Forme de très beau massif. Se multiplie rapidement.

Attrait particulier : Possède des fleurs blanches ou rosées.

Comarum palustre - Potentille des marais - Marsh Cinquefoil



Gary A. Monroe @ USDA-NRCS PLANTS Database

Position recommandée par rapport au talus		
Haut du talus	Milieu du talus	Bas du talus (zone littorale)
		X

Ensoleillement requis :
Dimensions : 20 à 50 cm ↕
Type de sol : Riche
Acidité du sol : Moyenne
Humidité du sol : Élevée
Zone de rusticité : 3
Période de floraison : Estivale




Susan McDougall @ USDA-NRCS PLANTS Database

Commentaires : Plante aquatique à rhizome rampant formant de vastes colonies au bord des rivières et des lacs. Les tiges s'avancent dans l'eau et servent de support à diverses plantes qui veulent s'y avancer. Aussi appelée « *Potentilla palustris* ».

Attrait particulier : Fleurs pourpres en forme d'étoile réunies par 3 ou 4.


Desmodium canadense - Desmodie du Canada - Canada Tick-Trefoil



Larry Allain @ USDA-NRCS PLANTS Database

Position recommandée par rapport au talus		
Haut du talus	Milieu du talus	Bas du talus (zone littorale)
X	X	

Ensoleillement requis :
Dimensions : 60 à 250 cm ↕ 45 cm ↔
Type de sol : Argileux
Acidité du sol : Alcalin
Humidité du sol : Moyenne
Zone de rusticité : 3-4
Période de floraison : Estivale



Jennifer Anderson @ USDA-NRCS PLANTS Database

Commentaires : Légumineuse indigène. Ses fruits ressemblent à de petits haricots. Possède des fleurs pourpres ou bleuâtres.

Epilobium angustifolium – Épilobe à feuilles étroites – Fireweed



Position recommandée par rapport au talus		
Haut du talus	Milieu du talus	Bas du talus (zone littorale)
X	X	

Ensoleillement requis :
Dimensions : 130 à 200 cm ↕ 40 cm ↔
Type de sol : Tous
Acidité du sol : Ne tolère pas les sol acides
Humidité du sol : Faible
Zone de rusticité : 2
Période de floraison : Estivale



Commentaires : Se retrouve dans les clairières et les bois brûlés. Très envahissante.

Attrait particulier : Fleurs roses formant de grandes populations donnant un effet spectaculaire.

Eurybia macrophylla – Aster à grandes feuilles – Large-leaved aster



Position recommandée par rapport au talus		
Haut du talus	Milieu du talus	Bas du talus (zone littorale)
X	X	

Ensoleillement requis :
Dimensions : 60 à 100 cm ↕ 45 cm ↔
Type de sol : Tous
Acidité du sol : Indéterminée
Humidité du sol : Moyenne
Zone de rusticité : 3
Période de floraison : Juillet à octobre



Commentaires : Indigène du Québec.

Attrait particulier : Fleurs mauve pâle et feuilles codiformes (en forme de cœur). Espèce appréciée par les pollinisateurs et les papillons.

Eutrochium maculatum - Eupatoire maculée - Joe-Pye-weed



Position recommandée par rapport au talus		
Haut du talus	Milieu du talus	Bas du talus (zone littorale)
X	X	

Ensoleillement requis :
Dimensions : 100 à 200 cm ↕ 90 cm ↔
Type de sol : Lourd, riche
Acidité du sol : Calcaire à légèrement acide
Humidité du sol : Moyenne à élevée
Zone de rusticité : 3
Période de floraison :
Juillet à septembre



© 2000 Janet Novak http://www.ct-botanical-

Commentaires : Espèce préférant les sols calcaires. Supporte les sols lourds. Plante imposante de très bonne rusticité . Se retrouve souvent dans les fossés humides.

Attrait particulier : Possède des fleurs pourpres étalées en larges corymbes. Son parfum rappelle celui des lilas. Attire les papillons.

Eupatorium perfoliatum - Eupatoire perfoliée - Perfoliate thoroughwort




Position recommandée par rapport au talus		
Haut du talus	Milieu du talus	Bas du talus (zone littorale)
X	X	

Ensoleillement requis :
Dimensions : 1 à 2m ↕ 0,45 m ↔
Type de sol : Riche
Acidité du sol : Neutre à alcalin
Humidité du sol : Élevée
Zone de rusticité : 3
Période de floraison : Estivale



Commentaires : On la retrouve dans les lieux humides, rivages et brûlés.

Geum rivale – Benoîte des ruisseaux – Water Avens


Lee Casebere @ USDA-NRCS PLANTS Database

Ensoleillement requis :
Dimensions : 30 à 60 cm ↕ 35 cm ↔
Type de sol : Riche et humide
Acidité du sol : Indéterminée
Humidité du sol : Élevée
Zone de rusticité : 3
Période de floraison : Mai à août

Position recommandée par rapport au talus		
Haut du talus	Milieu du talus	Bas du talus (zone littorale)
X	X	


Elaine Haug @ USDA-NRCS PLANTS Database

Commentaires : Espèce se retrouvant dans les lieux humides des forêts, en bordure des ruisseaux, dans les marécages et les tourbières. Croissance rapide.

Attrait particulier : Possède des fleurs de couleur crème avec des sépales pourpres.

Helenium autumnale – Hélénie automnale – Swamp Sunflower


Thomas G. Barnes @ USDA-NRCS PLANTS Database

Ensoleillement requis :
Dimensions : 30 à 100 cm ↕ 20 cm ↔
Type de sol : Argileux
Acidité du sol : Ne tolère pas les sols acides
Humidité du sol : Moyenne à élevée
Zone de rusticité : 4
Période de floraison : Estivale

Position recommandée par rapport au talus		
Haut du talus	Milieu du talus	Bas du talus (zone littorale)
X	X	


Jennifer Anderson @ USDA-NRCS PLANTS Database

Commentaires : Tolère les inondations périodiques. Plante facile de culture et qui attire la faune.

Attrait particulier : Fleurs jaunes éclatantes.

Hypericum ascyron - Millepertuis pyramidal - American great St. John's-wort



Ensoleillement requis :
Dimensions : 60 à 200 cm ↕ 60 cm ↔
Type de sol : Riche
Acidité du sol : Alcalin
Humidité du sol : Moyenne à élevée
Zone de rusticité : 4
Période de floraison : Estivale



Position recommandée par rapport au talus		
Haut du talus	Milieu du talus	Bas du talus (zone littorale)
X	X	

Commentaires : Les fleurs peuvent atteindrent 5 cm de diamètre. Attire les papillons.

Impatiens capensis - Impatiente du cap - Cape Touch-me-not



Ensoleillement requis :
Dimensions : 50 à 100 cm ↕ 75 cm ↔
Type de sol : Tous
Acidité du sol : Alcalin
Humidité du sol : Moyenne à élevée
Zone de rusticité : 3
Période de floraison : Estivale




Position recommandée par rapport au talus		
Haut du talus	Milieu du talus	Bas du talus (zone littorale)
X	X	

Commentaires : Croissance rapide. Attire les oiseaux-mouches. Le suc qui s'échappe des tiges écrasées est utilisé pour soulager les affections de l'herbe à puce.

Attrait particulier : Possède des fleurs orangées fortement tachetée formant des fruits en capsule allongée.

Iris versicolor – Iris versicolore – Larger Blue-Flag


Jennifer Anderson @ USDA-NRCS PLANTS Database

Ensoleillement requis :
Dimensions : 60 à 90 cm ↕ 40 cm ↔
Type de sol : Tous
Acidité du sol : Légèrement acide à neutre
Humidité du sol : Moyenne à élevée
Zone de rusticité : 3
Période de floraison : Juin

Position recommandée par rapport au talus		
Haut du talus	Milieu du talus	Bas du talus (zone littorale)
		X


R.A. Howard @ USDA-NRCS PLANTS Database

Commentaires : Fleur emblématique du Québec. Espèce aimant les sols humifères . Croît en colonie.

Attrait particulier : Magnifiques fleurs bleu mauve.

Lilium canadense – Lis du Canada – Wild Yellow Lily


Thomas G. Barnes @ USDA-NRCS PLANTS Database

Ensoleillement requis :
Dimensions : 60 à 200 cm ↕ 20 à 30 cm ↔
Type de sol : Tous
Acidité du sol : Neutre à légèrement acide
Humidité du sol : Moyenne
Zone de rusticité : 4
Période de floraison : Estivale

Position recommandée par rapport au talus		
Haut du talus	Milieu du talus	Bas du talus (zone littorale)
X	X	


R.A. Howard @ USDA-NRCS

Commentaires : L'une de nos plus belles fleurs indigènes. Fleurs jaune orangé généralement tachetées de brun.

Lobelia cardinalis – Lobélie du Cardinal – Cardinal-flower



Ensoleillement requis :
Dimensions : 90 cm ↕ 30 à 40 cm ↔
Type de sol : Argileux
Acidité du sol : Indéterminée
Humidité du sol : Moyenne à élevée
Zone de rusticité : 4
Période de floraison : Juillet-Août

Position recommandée par rapport au talus		
Haut du talus	Milieu du talus	Bas du talus (zone littorale)
X	X	



Commentaires : Espèce préférant les sols frais et riches. L'une de nos plus belles plante indigène. S'accommode bien en bordure d'un plan d'eau. Nécessite une protection hivernale. Difficile à implanter. Pour jardiniers avertis.

Attrait particulier : Magnifique inflorescence. Attire les colibris.

Lysimachia terrestris – Lysimaque terrestre – Yellow loosestrife



Ensoleillement requis :
Dimensions : 30 à 60 cm ↕ 20 cm ↔
Type de sol : Tous
Acidité du sol : Indéterminée
Humidité du sol : Élevée
Zone de rusticité : 2 à 6
Période de floraison : Estivale

Position recommandée par rapport au talus		
Haut du talus	Milieu du talus	Bas du talus (zone littorale)
		X



Commentaires : Plante envahissante des champs de canneberges et bleuets.

Attrait particulier : Fleurs jaunes regroupées en grappes.

Maianthemum stellatum - Smilacine étoilée - Star-flowered lily-of-the-valley



Position recommandée par rapport au talus		
Haut du talus	Milieu du talus	Bas du talus (zone littorale)
	X	

Ensoleillement requis :
Dimensions : 15 à 60 cm ↕ 45 cm ↔
Type de sol : Sableux
Acidité du sol : Élevée
Humidité du sol : Moyenne
Zone de rusticité : 1
Période de floraison : Printanière



Commentaires : Possède une tige arquée.

Attrait particulier : Possède des fleurs blanches et crème rappelant l'odeur du citron. Attire les oiseaux.

Mentha canadensis - Menthe du Canada - Canada mint



Position recommandée par rapport au talus		
Haut du talus	Milieu du talus	Bas du talus (zone littorale)
	X	X

Ensoleillement requis :
Dimensions : 15 à 45 cm ↕ 30 cm ↔
Type de sol : Tous
Acidité du sol : Légèrement acide à légèrement basique
Humidité du sol : Moyenne à élevée
Zone de rusticité : 1
Période de floraison : Estivale



Commentaires : Seule espèce de menthe indigène du Québec.

Attrait particulier : Fleurs roses et violettes. Feuilles comestibles et à l'odeur agréable.

Mimulus ringens - Mimule à feuilles entrouvertes - Monkey-flower


Thomas G. Barnes @ USDA-NRCS PLANTS Database

Position recommandée par rapport au talus		
Haut du talus	Milieu du talus	Bas du talus (zone littorale)
X	X	

Ensoleillement requis :
Dimensions : 30 à 100 cm ↕ 20 cm ↔
Type de sol : Tous
Acidité du sol : Indéterminée
Humidité du sol : Moyenne à élevée
Zone de rusticité : 4
Période de floraison : Estivale


© Missouri Botanical Garden, 2001-2008

Attrait particulier : Possède de grandes fleurs violettes dont le centre est blanc et blanc.

Monarda fistulosa - Monarde fistuleuse – Wild Bergamot


R.A. Howard @ USDA-NRCS PLANTS Database

Position recommandée par rapport au talus		
Haut du talus	Milieu du talus	Bas du talus (zone littorale)
X	X	

Ensoleillement requis :
Dimensions : 60 à 100 cm ↕ 45 cm ↔
Type de sol : Riche
Acidité du sol : Ne tolère pas les sols acides
Humidité du sol : Faible
Zone de rusticité : 4
Période de floraison : Estivale


Larry Allain @ USDA-NRCS PLANTS Database

Commentaires : Très parfumée et très particulière. À utiliser avec d'autres plantes compétitive pour limiter son expansion. Résiste aux maladies fongiques.

Attrait particulier : Les fleurs s'ouvrent le soir et la nuit, elles sont rouge-rose.

Myosotis laxa - Myosotis laxiflore - Small Forget-me-not



Ensoleillement requis :
Dimensions : 15 à 50 cm ↕ 35 cm ↔
Type de sol : Tous
Acidité du sol : Alcalin
Humidité du sol : Moyenne
Zone de rusticité : 3
Période de floraison : Printanière

Position recommandée par rapport au talus		
Haut du talus	Milieu du talus	Bas du talus (zone littorale)
X	X	



Commentaires : Croissance rapide. Forme de jolie tales.

Attrait particulier : Possède des fleurs bleues ou blanches.

Physostegia virginiana - Physostégie de Virginie - False Dragon-head



Ensoleillement requis :
Dimensions : 30 à 80 cm ↕ 40 cm ↔
Type de sol : Tous
Acidité du sol : Indéterminée
Humidité du sol : Moyenne à élevée
Zone de rusticité : 3
Période de floraison : Estivale

Position recommandée par rapport au talus		
Haut du talus	Milieu du talus	Bas du talus (zone littorale)
X	X	



Commentaires : De culture facile. Se propage rapidement.

Attrait particulier : Possède de très belles fleurs en épis rose.

Rudbeckia laciniata – Rudbeckie laciniée – Cut-leaved Coneflower



Ensoleillement requis :
Dimensions : 100 à 200 cm ↕ 75 cm ↔
Type de sol : Riche
Acidité du sol : Neutre à calcaire
Humidité du sol : Moyenne à élevée
Zone de rusticité : 3
Période de floraison :
Juillet à septembre

Position recommandée par rapport au talus		
Haut du talus	Milieu du talus	Bas du talus (zone littorale)
X	X	

Commentaires : La *Rudbeckia hirta* se cultive bien dans les sols pauvres et secs.

Attrait particulier : Grande fleur jaune qui ressemble à une marguerite dont les pétales sont recourbés vers le bas. Sa grandeur impressionne.



Scutellaria galericulata var. *pubescens* – Scutellaire à feuilles d'épilobe – Marsh skullcap



Ensoleillement requis :
Dimensions : 20 à 45 cm ↕ 15 cm ↔
Type de sol : Tous les types
Acidité du sol : Inderterminée
Humidité du sol : Élevée
Zone de rusticité : 3
Période de floraison :
Juin à septembre

Position recommandée par rapport au talus		
Haut du talus	Milieu du talus	Bas du talus (zone littorale)
		X

Commentaires : La cultiver en massif.

Attrait particulier : Possède des fleurs violettes. Appartient à la famille des menthes. Possède des propriétés médicinales.




Scutellaria lateriflora - Scutellaire à fleurs latérales - Side-flowering Skullcap


Patrick J. Alexander @ USDA-NRCS PLANTS Database

Position recommandée par rapport au talus		
Haut du talus	Milieu du talus	Bas du talus (zone littorale)
X	X	

Ensoleillement requis :
Dimensions : 10 à 80 cm ↕ 30 cm ↔
Type de sol : Limon, sable ou gravier
Acidité du sol : Alcalin
Humidité du sol : Moyenne
Zone de rusticité : 3
Période de floraison : Juin à septembre


Robert H. Mohlenbrock @ USDA-NRCS PLANTS Database / USDA SCS. 1989

Commentaires : La cultiver en massif.

Attrait particulier : Possède des fleurs en grappes généralement bleues parfois blanches ou roses. Appartient à la famille des menthes.

Solidago rugosa - Verge d'or rugueuse - Rough-stemmed goldenrod



Position recommandée par rapport au talus		
Haut du talus	Milieu du talus	Bas du talus (zone littorale)
X	X	

Ensoleillement requis :
Dimensions : 50 à 150 cm ↕ 30 cm ↔
Type de sol : Tous les types
Acidité du sol : Inderterminée
Humidité du sol : Faible à moyenne
Zone de rusticité : 3
Période de floraison : Juillet à septembre

Commentaires : Permet une bonne stabilisation des pentes. Plante rapidement envahissante.

Attrait particulier : Possède des fleurs jaunes abondantes. Espèce appréciée des pollinisateurs, papillons et oiseaux.

Verbena hastata - Verveine hastée - Blue Vervain


Patrick J. Alexander @ USDA-NRCS PLANTS Database

Position recommandée par rapport au talus		
Haut du talus	Milieu du talus	Bas du talus (zone littorale)
X	X	

Ensoleillement requis :
Dimensions : 100 à 200 cm ↕ 45 cm ↔
Type de sol : Tous
Acidité du sol : Alcalin
Humidité du sol : Moyenne
Zone de rusticité : 4
Période de floraison :
Juin à octobre


Jennifer Anderson @ USDA-NRCS PLANTS Database

Commentaires : Les feuilles peuvent être utilisées en infusion. Elle s'avère un choix idéal pour créer des masifs.

Attrait particulier : Possède de toutes petites fleurs bleues sur de longs épis compacts.

Zizia aurea - Zizia dorée - Golden Meadow-Parsnip


Larry Allain @ USDA-NRCS PLANTS Database

Position recommandée par rapport au talus		
Haut du talus	Milieu du talus	Bas du talus (zone littorale)
X	X	

Ensoleillement requis :
Dimensions : 30 à 100 cm ↕ 0,40 cm ↔
Type de sol : Tous
Acidité du sol : Alcalin
Humidité du sol : Moyenne à forte
Zone de rusticité : 3
Période de floraison :
Avril à juin


© Missouri Botanical Garden, 2001-2008

Commentaires : Structure aérée. Elle est très jolie en massif.